NUEVO TEST

TEST RÁPIDO INMUNIZACIÓN POST-VACUNACIÓN

INgezim® Test diagnóstico de detección anticuerpos específicos frente a la proteína de la espícula S

Ya te has vacunado pero..., ¿sabes si estás totalmente inmunizado?, ¿hasta cuándo tendrás anticuerpos?, ¿dispones de suficientes anticuerpos?

Los primeros tests diagnósticos de COVID aparecidos en el mercado fueron desarrollados entorno a la **proteína N**, ya que, en la mayoría de los casos, los **anticuerpos anti-N** son los primeros que aparecen y en más cantidad se producen tras la infección. En **personas solo vacunadas**, la **detección** y **evolución** de **anticuerpos específicos anti-S** se hace imprescindible para el seguimiento tras la vacunación y poder conocer su estado de inmunización. Se recomienda realizar este test no antes de los **15 días después de la vacunación completa**.

Para verificar o confirmar la inmunidad, se recomienda **repetir el test cada 3-6 meses**.

eurofins | Ingenasa

COMPONENTES DEL KIT:

- Dispositivos envasados individualmente
- Solución cromatografía monodosis
- Micropipetas plásticas graduadas de 20 ul
- Lancetas para punción digital

NEGATIVO

NO INMUNIZADO

POSITIVO

INMUNIZADO

¿CÓMO REALIZARLO?

El **ensayo** puede realizarse fácilmente utilizando **muestras de sangre** fresca a partir de **punción digital** con la lanceta.

Para más información, ver IFUs del test. [1]

CARACTERÍSTICAS DEL TEST

Producto	N° de tests	Precisión	Sensibilidad	Especificidad
INgezim® COVID 19 SPIKE CROM	5	No hay variación	99,9%*	99,7%

**15 días después de pauta completa.*

(1) www.salugraftdental.com/test-deteccion-anticuerpos-IFUs

salugraft DENTAL

SALUGRAFT DENTAL
salugraft@salugraftdental.com
T +34 932 380 735

Agente en Portugal: Nuncifarma
geral@nunci-farma.pt
T +351 961 637 375