Curaspon®

Esponja de gelatina hemostática y estéril para un solo uso
Curaspon® está esterilizada mediante irradiación gamma

Instrucciones de uso:
La esponja de gelatina Curaspon® se compone de gelatina porcina purificada al 100%, y está concebida para utilizarse como hemóstato absorbible en diversos campos de la cirugía. Es insoluble en agua y totalmente absorbible. Curaspon® se aplica directamente in situ o con una ligera presión hasta obtener la adhesión. Curaspon® puede aplicarse seca o previamente humedecida con una solución salina estéril. Curaspon® puede dejarse in situ o puede retirarse inmediatamente después de lograr la hemostasia. Debido a la naturaleza y a las características neutras de Curaspon®, puede utilizarse como transportador de cualquier fármaco (debe consultarse la documentación del producto de cada fármaco concreto para obtener la información de prescripción completa).
En cirugía odontológica, Curaspon® Dental es una ayuda para proporcionar hemostasia y para obliterar el espacio muerto creado por las extracciones dentales, las radicectomías, las extirpaciones de quistes y tumores y las extracciones de dientes impactados. Puede dejarse in situ, y se reabsorbe totalmente en el plazo de 4 a 6 semanas.
La cantidad de Curaspon® que debe aplicarse es proporcional a la extensión del área hemorrágica o al tamaño del espacio muerto. Curaspon® puede cortarse al tamaño deseado con tijeras estériles, sin que se produzcan desmenuzamientos ni roturas. Curaspon® presenta una adhesión escasa a las gasas y a los separadores.

Advertencias:
Antes del uso verifique la integridad del envase. La esterilidad está garantizada si el envase se mantiene seco y sin daños. En Curaspon® Dental60, los recipientes abiertos se pueden seguir utilizando debido a la naturaleza séptica de la boca, siempre que se tomen precauciones para impedir que cualquier fuente de contaminación (p. ej., humedad o saliva) entre en el recipiente. Utilice Curaspon® antes de la fecha de caducidad impresa en el envase. Aplique Curaspon® directamente después de abrir el envase. Cuando se aplique el producto, deben mantenerse condiciones de asepsia estrictas. Curaspon® no se puede reesterilizar, y debe desecharse el material Curaspon® no utilizado. La actividad hemostática de Curaspon® no permite dejar de realizar los procedimientos normales de hemostasia (sutura, compresión y ligadura). Cuando se introduzca Curaspon® en cavidades, se recomienda comprimir el producto sólo ligeramente a lo sumo, ya que la absorción de líquido provoca la expansión de la esponja hemostática a su tamaño normal y podría ejercer presión sobre las estructuras circundantes, lo cual puede causar complicaciones. En neurocirugía, Curaspon® no se debe dejar en cavidades cerradas, ya que podría causar compresión del tejido nervioso al expandirse.
Curaspon®, como todas las demás esponjas de gelatina hemostáticas, se ha diseñado para promover la detención de la hemorragia; el usuario debe valorar cuidadosamente por adelantado cualquier otro uso del producto. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Contraindicaciones:
No debe utilizarse en heridas infectadas.

Almacenamiento:
Almacenar en condiciones secas.

La empresa fabricante rechaza toda responsabilidad por quejas derivadas de un uso incorrecto del producto.

LCS001.03.ES