REGEDENT
smart regeneration

PASO A PASO

CLEAN&SEAL®

DIAGNÓSTICO
Inflamación
PD ≥ 5 mm o
PD ≥ 4 mm con BOP+

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
No enjuagar con clorhexidina el día del tratamiento

¡Guardar los productos refrigerados!

2°-8°

GEL LIMPIADOR
Instilar el gel de hipoclorito sódico con aminoácidos (PERISOLV) en el defecto.

¡Esperar que el gel actúe!

60 s

DESBRIDAMIENTO MECÁNICO
Utilizar tu técnica de limpieza preferida para eliminar el biofilm y el tejido de granulación.

SRP con curetas antes del enjuague con suero asegura retirar los restos.

¡PASO DE CONTROL!
Enjuagar con suero y examinar la limpieza.

Todavía sucio

Limpio

Normalmente, en dientes se requieren 2-3 ciclos de limpieza, mientras que en implantes suelen ser 5-7.

PREPARAR xHyA
Gel de ácido hialurónico cross-link (HYADENT BG).

GEL SELLADOR
Rellenar el defecto con HYADENT BG.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE
No comer ni beber en 2h.

No cepillar dientes en 24h.

PERIIMPLANTITIS
Durante 1 semana no cepillo interproximal ni hilo dental.

Si se requiere, enjuagar con clorhexidina 0,1-0,3%.

Todavía inflamación

CHEQUEO A 1 SEMANA
Examinar el estado de los tejidos.

Tejidos sanos

Re-sellado opcional con HYADENT BG después de unos días.

EVALUACIÓN A LOS 3 MESES
Chequear los parámetros clínicos BOP, CAL, PD.

EVALUACIÓN A LOS 6-9 MESES
Considerar control radiográfico y chequear los parámetros clínicos.

TERAPIA DE SOPORTE
Agendar controles en intervalos de 3-12 meses.

PASO A PASO VÍDEO
PERIODONTITIS

PASO A PASO VÍDEO
PERIIMPLANTITIS

SALUGRAFT DENTAL | T +34 932 380 735 | marketing@salugraftdental.com | www.salugraftdental.com

REGENERACIÓN PERIMPLANTARIA

Dr. Thomas Liechti, Suiza

DIAGNÓSTICO



ANTES

Profundidad de bolsa 7mm, BOP+, tejido blando infectado alrededor del implante con secreción purulenta, después de retirar la corona.

CLEAN&SEAL®

Retirar el tejido de granulación después de cada aplicación de **PERISOLV** y desbridamiento mecánico. Iniciar la regeneración rellenando la bolsa con **HYADENT BG**.

SEGUIMIENTO

DESPUÉS

6 meses después de **CLEAN&SEAL®**: Tejidos bien sellados, 5mm de profundidad de bolsa y con un incremento visible de hueso alrededor del implante, muestran la progresión de la regeneración de tejidos blandos y duros.

REGENERACIÓN PERIODONTAL

Dr. Eglė Ramanauskaitė, Lituania

DIAGNÓSTICO

ANTES

Bolsa periodontal profunda (PD>10mm). Periodontitis Estadio III Grado B.

CLEAN&SEAL®

Instilar **PERISOLV** en las bolsas periodontales 60 segundos antes de la instrumentación subgingival.

La aplicación debe ser repetida durante el desbridamiento subgingival, hasta que en el enjuagado con suero salino no salgan más partículas de biofilm o tejido de granulación.

Instilar **HYADENT BG** en todas las bolsas periodontales tratadas, después del desbridamiento subgingival.

SEGUIMIENTO

DESPUÉS

Bolsa periodontal 6 meses después de **CLEAN&SEAL®**. PD 3mm. Se observa una mejora y reducción gradual en la profundidad de sondaje en los seguimientos a 3 y 6 meses.

DESCARGA LOS ESTUDIOS

BOLSAS AGUDAS*

- **99% cierre de bolsas infectadas**
- **57% reducción del PD**
- **61% mejora adhesión tejidos (CAL)**
- **96% cese sangrado (BOP)**

* Ramanauskaitė y cols. 2023

BOLSAS RESIDUALES**

- **2mm mejor adhesión tejidos (CAL)**
- **58% mejora del BOP**
- **2mm reducción profundidad bolsa (PPD)**

** Diehl y cols. 2022

Distribuidor oficial en España: salugraft DENTAL

SALUGRAFT DENTAL | www.salugraftdental.com | marketing@salugraftdental.com | T +34 932 380 735